



Catálogo de autoridades taxonómicas de los reptiles (Reptilia:Chordata) de México

Forma de citar: CONABIO (comp.). 2009. Catálogo de autoridades taxonómicas de los reptiles (Reptilia: Chordata) de México. Base de datos SNIB-CONABIO. México.
Incluye información del proyecto CS003.

Reino Animalia Linnaeus, 1758

Phylum Chordata Bateson, 1885

Subphylum Vertebrata Cuvier, 1812

Clase Reptilia Owen, 1842

Orden Crocodylia Owen, 1842

Familia Alligatoridae Gray, 1844

géneros: 1, especies: 1

Género *Caiman* Gray 1844

C. crocodylus (Linnaeus, 1758)

Familia Crocodylidae

géneros: 1, especies: 2

Género *Crocodylus* Laurenti, 1768

C. acutus (Cuvier, 1807)

C. moreletii (Duméril & Duméril, 1851)

Orden Squamata Opperl, 1811

Familia Anguillidae

géneros: 7, especies: 47

Género *Abronia* Gray, 1838

A. bogerti Tihen, 1954

A. chiszari Smith & Smith, 1981

A. deppii (Wiegmann, 1828)

A. fuscolabialis (Tihen, 1944)

A. graminea (Cope, 1864)

A. leurolepis Campbell & Frost, 1993

A. lythrochila Smith & Alvarez del Toro, 1963

A. martindelcampoi Flores-Villela, O. & O. Sánchez-H., 2003

A. matudai (Hartweg & Tihen, 1946)

A. mitchelli Campbell, 1982

A. mixteca Bogert & Porter, 1967

A. oaxacae (Günther, 1885)

A. ochoterenai (Martín del Campo, 1939)

A. ornelasi Campbell, 1984

A. ramirezi Campbell, 1994

A. reidi Werler & Shannon, 1961

A. smithi Campbell, J. A. & D. R. Frost, 1993

A. taeniata (Wiegmann, 1828)

Género *Barisia* Gray, 1838

B. ciliaris Smith, 1942

B. herrerae Zaldivar-Riverón & Nieto-Montes de Oca, 2002

B. imbricata (Wiegmann, 1828)

B. jonesi Guillea & Smith, 1982

B. levicollis Stejneger, 1890

B. planifrons Bocourt, 1878

B. rudicollis (Wiegmann, 1828)

Género *Celestus* Gray 1838

C. enneagrammus (Cope, 1860)

C. legnotus (Campbell & Camarillo, 1994)

C. rozellae Smith, 1942

Género *Elgaria* Gray, 1838

E. cedrosensis Fitch, 1934

E. kingi Gray, 1838

E. multicarinata (Blainville, 1835)

E. nana Fitch, 1934

E. parva (Knight & Scudday, 1985)

- E. paucicarinata* (Fitch, 1934)
E. usafa Smith, Lemos-Espinal & Ingrasci, 2003
E. velazquezii Grismer & Hollingsworth, 2001
 Género *Gerrhonotus* Wiegmann, 1828
G. infernalis Baird, 1858
G. liocephalus Wiegmann, 1828
G. lugoi McCoy, 1970
G. ophiurus Cope, 1866
 Género *Mesaspis* Cope, 1877
M. antauges (Cope, 1866)
M. gadovii (Boulenger, 1913)
M. juarezi (Karges & Wright, 1987)
M. moreleti (Bocourt, 1871)
M. viridiflava (Bocourt, 1873)
- Familia Anniellidae géneros: 1, especies: 2
- Género *Anniella* Gray, 1852
A. geronimensis Shaw, 1940
A. pulchra Gray, 1852
- Familia Corytophanidae géneros: 3, especies: 6
- Género *Basiliscus* Laurenti, 1768
B. vittatus Wiegmann, 1828
 Género *Corytophanes* Boie in Schlegel, 1826
C. cristatus (Merrem, 1821)
C. hernandezi (Wiegmann, 1831)
C. percarinatus Duméril, 1856
 Género *Laemanctus* Wiegmann, 1834
L. longipes Wiegmann, 1834
L. serratus Cope, 1864
- Familia Crotaphytidae géneros: 2, especies: 10
- Género *Crotaphytus* Holbrook, 1842
C. antiquus Axtell & Webb, 1995
C. collaris (Say en James, 1823)
C. dickersonae Schmidt, 1922
C. grismeri McGuire, 1994
C. insularis Van Denburgh & Slevin, 1921
C. nebrius Axtell & Montanucci, 1977
C. reticulatus Baird, 1858
C. vestigium Smith & Tanner, 1972
 Género *Gambelia* Baird, 1859
G. copeii Yarrow, 1882
G. wislizenii (Baird & Girard, 1852)
- Familia Dibamidae Boulenger, 1884 géneros: 1, especies:
- Género *Anguis* Linnaeus, 1758
A. ceroni Holman, 1965
A. incomptus McConkey, 1955
- Familia Eublepharidae géneros: 1, especies: 7
- Género *Coleonyx* Gray, 1845
C. brevis Stejneger, 1893
C. elegans Gray, 1845
C. fasciatus (Boulenger, 1885)
C. gypsicolus Grismer & Ottley, 1988
C. reticulatus Davis & Dixon, 1958
C. switaki (Murphy, 1974)
C. variegatus (Baird, 1858)
C. variegatus subsp. *abbotti* Klauber, 1945
C. variegatus subsp. *peninsularis* Klauber, 1945
C. variegatus subsp. *sonoriensis* Klauber, 1945

Familia Gekkonidae

géneros: 7, especies: 24

- Género *Aristelliger* Cope, 1861
A. georgeensis (Bocourt, 1873)
 Género *Gehyra* Gray, 1834
G. mutilata (Wiegmann, 1835)
 Género *Gonatodes* Fitzinger, 1843
G. albogularis (Duméril & Bribon, 1836)
 Género *Hemidactylus* Gray, 1825
H. frenatus Schlegel, 1836
H. mabouia (Moreau de Jonnés, 1818)
H. turcicus (Linnaeus, 1758)
 Género *Phyllodactylus* Gray, 1828
P. bordai Taylor, 1942
P. bugastrolepis Dixon, 1966
P. davisii Dixon, 1964
P. delcampoi Mosauer, 1936
P. duellmani Dixon, 1960
P. homolepidurus Smith, 1935
P. lanei Smith, 1935
P. muralis Taylor, 1940
P. nocticolus Dixon, 1964
P. partidus Dixon, 1966
P. paucituberculatus Dixon, 1960
P. tuberculosus Wiegmann, 1834
P. unctus (Cope, 1863)
P. xanti (Cope, 1863)
 Género *Sphaerodactylus* Wagler, 1830
S. argus Gosse, 1850
S. glaucus Cope, 1865
S. millepunctatus Hallowell, 1861
 Género *Thecadactylus* Goldfuss, 1820
T. rapicaudus (Houttuyn, 1782)

Familia Gymnophthalmidae

géneros: 1, especies: 1

- Género *Gymnophthalmus* Merrem, 1820
G. speciosus (Hallowell, 1861)

Familia Helodermatidae

géneros: 1, especies: 2

- Género *Heloderma* Wiegmann, 1829
H. horridum (Wiegmann, 1829)
H. suspectum Cope, 1869

Familia Iguanidae

géneros: 4, especies: 20

- Género *Ctenosaura* Wiegmann, 1828
C. acanthura (Shaw, 1802)
C. alfredschmidti Köhler, 1995
C. clarki (Bailey, 1928)
C. conspicuosa Lowe & Norris, 1955
C. defensor Cope, 1866
C. hemilopha (Cope, 1863)
C. macrolopha Smith, 1972
C. nolascensis Smith, 1972
C. oaxacana Köhler & Hasbun, 2001
 Sinónimos
Ctenosaura quinquecarinata (Gray, 1842)
C. pectinata (Wiegmann, 1834)
C. similis (Gray, 1831)
 Género *Dipsosaurus* Hallowell, 1854
D. catalinensis Van Denburgh, 1922
D. dorsalis (Baird & Girard, 1852)
D. dorsalis subsp. *dorsalis* (Baird & Girard, 1852)
D. dorsalis subsp. *lucasensis* Van Denburgh, 1920

Género *Iguana* Laurenti, 1768

I. iguana (Linnaeus, 1758)

Género *Sauromalus* Duméril, 1856

S. ater Duméril, 1856

S. hispidus Stejneger, 1891

S. klauberi Shaw, 1941

S. obsus (Baird, 1859)

S. slevini Van Denburgh, 1922

S. varius Dickerson, 1919

Familia Phrynosomatidae

géneros: 9, especies: 126

Género *Callisaurus* de Blainville 1835

C. draconoides Blainville, 1835

C. draconoides subsp. *carmenensis* Dickerson, 1919

C. draconoides subsp. *draconooides* Blainville, 1835

C. draconoides subsp. *inusitatus* Dickerson, 1919

Género *Cophosaurus* Troschel, 1852

C. texanus Troschel, 1852

Género *Holbrookia* Girard, 1851

H. approximans Baird, 1858

H. lacerata Cope, 1880

H. maculata Girard, 1851

H. propinqua Baird & Girard, 1852

Género *Petrosaurus* Boulenger, 1885

P. mearnsi (Stejneger, 1894)

P. repens Van Denburgh, 1895

P. slevini Van Denburgh, 1922

P. thalassinus (Cope, 1863)

Género *Phrynosoma* Wiegmann, 1828

P. asio Cope, 1864

P. braconnieri Duméril & Bocourt, 1870

P. cornutum (Harlan, 1825)

P. coronatum (Blainville, 1835)

P. ditmarsii Stejneger, 1906

P. douglasii (Bell, 1829)

P. hernandesii Girard, 1858

P. mcallii (Hallowell, 1852)

P. modestum Girard, 1852

P. orbiculare (Linnaeus, 1789)

P. platyrhinos Girard, 1852

P. solare Gray, 1845

P. taurus Dugès, 1868

Género *Sceloporus* Wiegmann, 1828

S. acanthinus Bocourt, 1873

S. adleri Smith & Savitzky, 1974

S. aeneus Wiegmann, 1828

S. anahuacus Lara-Góngora, 1983

S. angustus (Dickerson, 1919)

S. asper Boulenger, 1897

S. bicanthalis Smith, 1937

S. bulleri Boulenger, 1894

S. carinatus Smith, 1936

S. cautus Smith, 1938

S. chaneyi Liner & Dixon, 1992

S. chrysostictus Cope, 1866

S. clarkii Baird & Girard, 1852

S. couchi Baird, 1859

S. cowlesi Lowe & Norris, 1956

Sinónimos

Sceloporus edbelli Smith, Chiszar & Lemos-Espinal, 2002

S. cozumelae Jones, 1927
S. cryptus Smith & Lynch, 1967
S. dugesii Bocourt, 1873
S. edwardtaylori Smith, 1936
S. exsul Dixon, Ketchersid & Lieb, 1972
S. formosus Wiegmann, 1834
S. gadoviae Boulenger, 1905
S. goldmani Smith, 1937
S. graciosus Baird & Girard, 1852
S. grammicus Wiegmann, 1828
S. grandaevus (Dickerson, 1919)
S. halli Dasman & Smith, 1974
S. heterolepis Boulenger, 1894
S. horridus Wiegmann, 1834
S. hunsakeri Hall & Smith, 1979
S. insignis Webb, 1967
S. internasalis Smith & Bumzahem, 1955
S. jalapae Günther, 1890
S. jarrovii Cope, 1875
S. jarrovii subsp. *cyanostictus* Axtell & Axtell, 1971
S. lemosespinalis Lara-Góngora, 2003
S. licki Van Denburgh, 1895
S. lineatulus Dickerson, 1919
S. lundelli Smith, 1939
S. macdougalli Smith & Bumzahem, 1953
S. maculosus Smith, 1934
S. magister Hallowell, 1854
S. marmoratus Hallowell, 1852
S. megalepidurus Smith, 1934
S. melanorhinus Bocourt, 1876
S. merriami Stejneger, 1904
S. minor Cope, 1885
S. mucronatus Cope, 1885
S. nelsoni Cochran, 1923
S. oberon Smith & Brown, 1941
S. occidentalis Baird & Girard, 1852
S. ochoterena Smith, 1934
S. olivaceus Smith, 1934
S. olloporus Smith, 1937
S. orcutti Stejneger, 1893
S. ornatus Baird, 1859
S. palaciosi Lara-Góngora, 1983
S. parvus Smith, 1934
S. poinsetti Baird & Girard, 1852
S. pyrocephalus Cope, 1864
S. salvini Günther, 1890
S. samcolemani Smith & Hall, 1974
S. scalaris Wiegmann, 1828
S. serrifer Cope, 1866
S. siniferus Cope, 1869
S. slevini Smith, 1937
S. smaragdinus Bocourt, 1873
S. smithi Hartweg & Oliver, 1937
S. spinosus Wiegmann, 1828
S. squamosus Bocourt, 1874
S. stejnegeri Smith, 1942
S. subpictus Lynch & Smith, 1965
S. sugillatus Smith, 1942

S. taenioconemnis Cope, 1885
S. tanneri Smith & Larsen, 1975
S. teapensis Günther, 1890
S. torquatus Wiegmann, 1828
S. undulatus Bosc & Daudin en Sonnini & Latreille, 1801
S. utiformis Cope, 1864
S. vandenburgianus Cope, 1896
S. variabilis Wiegmann, 1834
S. virgatus Smith, 1938
S. zosteromus Cope, 1863

Género *Uma* Baird, 1858

U. exsul Schmidt & Bogert, 1947
U. notata Baird, 1858
U. paraphygas Williams, Chrapliwy & Smith, 1959
U. rufopunctata Cope, 1895

Género *Urosaurus* Hallowell, 1854

U. auriculatus (Cope, 1871)
U. bicarinatus (Duméril, 1856)
U. clarionensis (Townsend, 1890)
U. gadovi (Schmidt, 1921)
U. graciosus Hallowell, 1854
U. lahtelai Rau & Loomis, 1977
U. nigricaudus (Cope, 1864)
U. ornatus (Baird & Girard, 1852)

Género *Uta* Baird & Girard, 1852

U. concinna Dickerson, 1919
U. encantadae Grismer, 1994
U. lowei Grismer, 1994
U. mannophora Dickerson, 1919
U. nolascensis Van Denburgh & Slevin, 1921
U. palmeri Stejneger, 1890
U. squamata Dickerson, 1919
U. stansburiana Baird & Girard, 1852
U. tumidarostra Grismer, 1994

Familia Polychridae

Género *Anolis* (Daudin, 1802)

A. adleri Smith, 1972
A. allisoni Barbour, 1828
A. alvarezdeltoroi Nieto-Montes de Oca, 1996
A. anisolepis Smith, Burley & Fritts, 1968
A. baccatus Bocourt, 1873
A. barkeri Schmidt, 1939
A. biporcatus (Wiegmann, 1834)
A. breedlovei Smith & Paulson, 1968
A. capito Peters, 1863
A. carolinensis Voigt, 1832
A. compressicauda Smith & Kerster, 1955
A. crassulus Cope, 1864
A. cumingii Peters, 1863
A. cuprinus Smith, 1964
A. cymbops Cope, 1864
A. dollfusianus Bocourt, 1873
A. duellmani Fitch & Henderson, 1973
A. dunnii Smith, 1936
A. forbesi Smith & Van Gelder, 1955
A. gadovii Boulenger, 1905
A. hobartsmithi Nieto-Montes de Oca, 2001
A. isthmicus Fitch, 1978

géneros: 1, especies: 52

A. laeviventris (Wiegmann, 1834)
A. lemurus Cope, 1861
A. liogaster Boulenger, 1905
A. macrinii Smith, 1968
A. matudai Smith, 1956
A. megapholidotus Smith, 1933
A. microlepidotus Davis, 1954
A. milleri Smith, 1950
A. naufragus Campbell, Hillis & Lamar, 1989
A. nebuloides Bocourt, 1873
A. nebulosus (Wiegmann, 1834)
A. omiltemanus Davis, 1954
A. parvicirculatus Alvarez del Toro & Smith, 1956
A. pentaprion Cope, 1862
A. petersi Bocourt, 1873
A. polyrhachis Smith, 1968
A. pygmaeus Alvarez del Toro & Smith, 1956
A. quercorum Fitch, 1978
A. rodriguezii Bocourt, 1873
A. sagrei Duméril & Bibron, 1837
A. schiedei (Wiegmann, 1834)
A. schmidtii Smith, 1939
A. sericeus Hallowell, 1856
A. serranoi (Köhler, 1999)
A. simmonsii Holman, 1964
A. subocularis Davis, 1954
A. taylori Smith & Spieler, 1945
A. tropidonotus Peters, 1863
A. uniformis Cope, 1885
A. utowanae Barbour, 1932

Familia Scincidae

géneros: 5, especies: 26

Género *Eumeces* Wiegmann, 1834

E. altamirani Dugès, 1891
E. brevirostris (Günther, 1860)
E. colimensis Taylor, 1935
E. copei Taylor, 1933
E. dugesi Thominot, 1883
E. gilberti Van Denburgh, 1896
E. lagunensis Van Denburgh, 1895
E. lynxe Wiegmann, 1834
E. multilineatus Tanner, 1957
E. multivirgatus (Hallowell, 1857)
E. obsoletus (Baird & Girard, 1852)
E. ochoterenae Taylor, 1933
E. parviauriculatus Taylor, 1933
E. parvulus Taylor, 1933
E. schwartzei Fischer, 1884
E. skiltonianus (Baird & Girard, 1852)
E. sumichrasti (Cope, 1866)
E. tetragrammus (Baird, 1858)

Género *Mesoscincus* Griffith, Ngo & Murphy, 2000

M. altamirani Dugès, 1891
M. schwartzei Fischer, 1884

Género *Scincella* Mittleman, 1950

S. gemmingeri (Cope, 1864)
S. lateralis (Say, 1823)
S. silvicola (Taylor, 1937)

Género *Sphenomorphus* Fitzinger, 1843

- S. assatus* (Cope, 1864)
- S. cherriei* (Cope, 1893)
- S. incertum* (Stuart, 1940)

Familia Teiidae

géneros: 2, especies: 45

Género *Ameiva* Meyer, 1795

- A. chaitzami* Stuart, 1942
- A. festiva* (Lichtenstein & Von Martens, 1856)
- A. undulata* (Wiegmann, 1834)

Género *Aspidoscelis* Reeder, T. W., C. J. Cole & H. C. Dessauer, 2002

- A. angusticeps* (Cope, 1878)
- A. bacatus* (Van Denburgh & Slevin, 1921)

Sinónimos*Aspidoscelis tigrisaethiops* Cope, 1900

- A. burti* (Taylor, 1938)
- A. calidipes* (Duellman, 1955)
- A. canus* (Van Denburgh & Slevin, 1921)

Sinónimos*Aspidoscelis tigris tigris* Baird & Girard, 1852

- A. carmenensis*
- A. catalinensis* (Van Denburgh & Slevin, 1921)
- A. celeripes* (Dickerson, 1919)

Sinónimos*Aspidoscelis tigris rubidus* Cope, 1892

- A. ceralbensis* (Van Denburgh & Slevin, 1921)
 - A. communis* (Cope, 1878)
 - A. communis* subsp. *mariarum* Günther, 1885
 - A. costata* (Cope, 1878)
 - A. cozumela* (Gadow, 1906)
 - A. cozumela* subsp. *cozumela* Gadow, 1906
 - A. danheimae* (Burt, 1929)
 - A. deppii* (Wiegmann, 1834)
 - A. espiritensis* (Van Denburgh & Slevin, 1921)
 - A. estebanensis* (Dickerson, 1919)
- Sinónimos**
- Aspidoscelis tigris gracilis* (Van Denburgh & Slevin, 1921)
- A. exsanguis* (Lowe, 1956)
 - A. franciscensis* (Van Denburgh & Slevin, 1921)
 - A. gularis* (Baird & Girard, 1852)
 - A. guttata* (Wiegmann, 1834)
 - A. guttata* subsp. *immutabilis* Cope, 1878
 - A. hyperythra* (Cope, 1863)
 - A. hyperythra* subsp. *beldingi* Stejneger, 1894
 - A. hyperythra* subsp. *hyperythra* Cope, 1863
 - A. hyperythra* subsp. *schmidtii* (Van Denburgh & Slevin, 1921)
 - A. inornata* (Baird, 1859)
 - A. inornata* subsp. *inornata* Baird, 1859
 - A. labialis* (Stejneger, 1890)
 - A. laredoensis* (McKinney, Kay & Anderson, 1973)
 - A. lineatissima* (Cope, 1878)
 - A. lineatissima* subsp. *lividia* Duellman & Wellman, 1960
 - A. martyris* (Stejneger, 1892)
 - A. maslini* (Fritts, 1969)
 - A. maximus* (Cope, 1863)
 - A. mexicana* (Peters, 1870)
 - A. motaguae* (Sackett, 1941)
 - A. neomexicana* (Lowe & Zweifel, 1952)
 - A. opatae* (Wright, 1967)
 - A. parvisocia* (Zweifel, 1960)

- A. picta*
A. rodecki (McCoy & Maslin, 1962)
A. sacki (Wiegmann, 1834)
A. septemvittatus (Cope, 1892)
A. sexilineata (Linnaeus, 1766)
A. sonorae (Lowe & Wright, 1964)
A. tessellata (Say, 1823)
A. tigris (Baird & Girard, 1852)
A. tigris subsp. *multiscutatus* Cope, 1892
A. tigris subsp. *vandenburghi* Dickerson, 1919
A. tigris subsp. *vividus* Walker, 1981
A. uniparens (Wright & Lowe, 1965)
- Familia Xantusiidae géneros: 2, especies: 20
- Género *Lepidophyma* Duméril, 1851
- L. chicoasensis* Alvarez & Valentin, 1988
L. dontomasi Smith, 1942
L. flavimaculatum Duméril, 1851
L. gaigeae Mosauer, 1936
L. lineri Smith, 1973
L. lipetzi Smith & Alvarez del Toro, 1977
L. lowei Bezy & Camarillo, 1997
L. micropholis Walker, 1955
L. occulor Smith, 1942
L. pajapanensis Werler, 1957
L. radula Smith, 1942
L. smithi Bocourt, 1876
L. sylvaticum Taylor, 1939
L. tarascae Bezy, Webb & Alvarez, 1982
L. tuxtlae Werler & Shannon, 1957
- Género *Xantusia* Baird, 1858
- X. bolsonae* Webb, 1970
X. extorris Webb, 1965
X. henshawi Stejneger, 1893
X. sanchezi Bezy & Flores-Villela, 1999
X. vigilis Baird, 1858
- Familia Xenosauridae Cope, 1866 géneros: 1, especies: 6
- Género *Xenosaurus* Peters, 1861
- X. grandis* (Gray, 1856)
X. newmanorum Taylor, 1949
X. penai Pérez-Ramos, E., L. Saldaña de la Riva & J.A. Campbell, 2000
X. phalaroanthereon Nieto-Montes de Oca, A., J. A. Campbell & O. Flores-Villela, 2001
X. platyceps King & Thompson, 1968
X. rectocollaris Smith & Iverson, 1993
- Suborden Ambhisbaenia
- Familia Bipedidae Taylor, 1951 géneros: 1, especies: 3
- Género *Bipes* de Lacepède, 1788
- B. biporus* (Cope, 1894)
B. canaliculatus Bonnaterre, 1789
B. tridactylus (Dugès, 1894)
- Suborden Serpentes Linnaeus, 1758
- Familia Boidae Gray, 1825 géneros: 2, especies: 2
- Género *Boa* Linnaeus, 1758
- B. constrictor* (Linnaeus, 1758)
B. constrictor subsp. *imperator* Daudin, 1803
- Género *Charina* Gray, 1849
- C. trivirgata* (Cope, 1861)
 Sinónimos
Lichanura trivirgata Cope, 1861
C. trivirgata subsp. *roseofusca* (Cope, 1868)

- C. trivirgata* subsp. *saslowi* (Spiteri, 1987)
C. trivirgata subsp. *trivirgata* (Cope, 1861)
- Familia Colubridae Opperl, 1811
- Género *Adelophis* Cope, 1879
- A. copei* Dugès, 1879
A. foxi Rossman & Blaney, 1968
- Género *Adelphicos* Jan, 1862
- A. latifasciatus* Lynch & Smith, 1966
A. nigrilatus Smith, 1942
A. quadrivirgatum Jan, 1862
A. sargii Fischer, 1885
A. visoninus Cope, 1866
- Género *Amastridium* Cope, 1860
- A. veliferum* Cope, 1861
- Género *Arizona* Kennicott, 1859
- A. elegans* Kennicott, 1859
A. pacata Klauber, 1946
- Género *Bogertophis* Dowling & Price, 1988
- B. rosaliae* (Mocquard, 1899)
B. subocularis (Brown, 1901)
- Género *Chersodromus* Reinhardt, 1860
- C. liebmanni* Reinhardt, 1860
C. rubriventris (Taylor, 1949)
- Género *Chilomeniscus* Cope, 1860
- C. savagei* Cliff, 1954
C. stramineus Cope, 1860
- Género *Chionactis* Cope, 1860
- C. occipitalis* (Hallowell, 1854)
C. palastrois (Klauber, 1937)
- Género *Clelia* Fitzinger, 1826
- C. clelia* (Daudin, 1803)
C. scytalina (Cope, 1867)
- Género *Coluber* Linnaeus, 1758
- C. constrictor* Linnaeus, 1758
- Género *Coniophanes* Cope, 1860
- C. alvarezi* Campbell, 1989
C. bipunctatus (Günther, 1858)
C. fissidens (Günther, 1858)
C. imperialis (Kennicott en Baird, 1859)
C. lateritius Cope, 1862
C. melanocephalus (Peters, 1869)
C. meridanus Schmidt & Andrews, 1936
C. piceivittis Cope, 1870
C. quinquevittatus (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
C. sarae Ponce-Campos & Smith, 2001
- Género *Conophis* Peters, 1860
- C. lineatus* (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
C. lineatus subsp. *concolor* (Cope, 1867)
C. morai Pérez-Higareda, López-Luna & Smith, 2002
C. pulcher Cope, 1869
C. vittatus Peters, 1860
- Género *Conopsis* Günther, 1858
- C. biserialis* Taylor & Smith, 1942
C. conica Taylor & Smith, 1942
C. lineata Kennicott, 1859
C. megalodon Taylor & Smith, 1942
C. nasus Günther, 1858
- Género *Cryophis* Bogert & Duellman, 1963

géneros: 68, especies: 280

- C. hallbergi* Bogert & Duellman, 1963
 Género *Dendrophidion* Fitzinger, 1843
D. vinitor Smith, 1941
 Género *Diadophis* Baird & Girard, 1853
D. punctatus (Linnaeus, 1766)
 Género *Dipsas* Laurenti, 1768
D. brevifacies (Cope, 1866)
D. gaigeae (Oliver, 1937)
 Género *Dryadophis* Stuart, 1939
D. cliftoni Hardy, 1964
D. melanolomus (Cope, 1868)
D. melanolomus subsp. *veraecrucis* Stuart, 1941
 Género *Drymarchon* Fitzinger, 1843
D. corais (Boie, 1827)
D. melanurus (Duméril Bibron & Duméril, 1854)
 Género *Drymobius* Fitzinger, 1843
D. chloroticus (Cope, 1886)
D. margaritiferus (Schlegel, 1837)
 Género *Enulius* Cope, 1871
E. flavitorques (Cope, 1869)
E. oligostichus Smith, Arndt & Sherbrooke, 1967
 Género *Eridiphas* Leviton & Tanner, 1960
E. slevini (Tanner, 1943)
 Sinónimos
Eridiphas marcosensis Ottley & Tanner, 1978
 Género *Ficimia* Gray, 1849
F. hardyi Mendoza-Quijano & Smith, 1993
F. olivacea Gray, 1849
F. publia Cope, 1866
F. ramirezi Smith & Langebartel, 1950
F. ruspator Smith & Taylor, 1941
F. streckeri Taylor, 1931
F. variegata (Günther, 1858)
 Género *Geagras* Cope, 1876
G. redimitus Cope, 1876
 Género *Geophis* Wagler, 1830
G. anocularis Dunn, 1920
G. bicolor Gunther, 1868
G. blanchardi Taylor & Smith, 1939
G. cancellatus Smith, 1941
G. carinosus Stuart, 1941
G. chalybeus (Wagler, 1830)
G. dubius (Peters, 1861)
G. duellmani Smith & Holland, 1969
G. dugesii Bocourt, 1883
G. immaculatus Downs, 1967
G. incomptus Duellman, 1959
G. isthmicus (Boulenger, 1883)
G. juarezi Nieto-Montes de Oca, 2003
G. juliai Pérez-Higareda, Smith & López-Luna, 2001
G. laticinctus Smith & Williams, 1963
G. laticollaris Smith, Lynch & Altig, 1965
G. latifrontalis Garman, 1883
G. maculiferus Taylor, 1941
G. mutitorques (Cope, 1885)
G. nasalis (Cope, 1868)
G. nigrocinctus Duellman, 1959
G. omiltemanus Günther, 1893
G. petersii Boulenger, 1894

- G. pyburni* Campbell & Murphy, 1977
G. rhodogaster (Cope, 1868)
G. russatus Smith & Williams, 1966
G. sallaei Boulenger, 1894
G. semidoliatus (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
G. sieboldi (Jan, 1862)
G. tarascae Hartweg, 1959
Género *Gyalopion* Cope, 1860
G. canum Cope, 1860
G. quadrangulare (Günther, 1893)
Género *Heterodon* Latreille in Sonnini & Latreille, 1801
H. kennerlyi Kennicott, 1860
Género *Hypsiglena* Cope, 1860
H. gularis Tanner, 1954
H. torquata (Günther, 1860)
H. torquata subsp. *deserticola* Tanner, 1944
H. torquata subsp. *klauberi* Tanner, 1944
H. torquata subsp. *ochrorhyncha* Cope, 1860
Género *Imantodes* Duméril, 1853
I. cenchoa (Linnaeus, 1758)
I. gemmistratus Cope, 1860
I. tenuissimus Cope, 1866
Género *Lampropeltis* Fitzinger, 1843
L. alterna (Brown, 1901)
L. catalinensis Van Denburgh & Slevin, 1921
L. getula (Linnaeus, 1766)
L. herrerae Van Denburgh & Slevin, 1923
L. knoblochi Taylor, 1940
L. mexicana (Garman, 1884)
L. pyromelana (Cope, 1867)
L. ruthveni Blanchard, 1920
L. triangulum (Lacépède, 1789)
L. triangulum subsp. *polyzona* (Cope, 1860)
L. zonata (Lockington ex Blainville, 1835)
Género *Leptodeira* Fitzinger, 1843
L. annulata (Linnaeus, 1758)
L. frenata Cope, 1886
L. maculata (Hallowell, 1861)
L. nigrofasciata Günther, 1868
L. punctata (Peters, 1866)
L. septentrionalis Kennicott, 1859
L. splendida Günther, 1895
Género *Leptophis* Bell, 1825
L. ahaetulla (Linnaeus, 1758)
L. ahaetulla subsp. *praestans* (Cope, 1868)
L. diplotropis (Günther, 1872)
L. mexicanus Duméril, Bribon & Duméril, 1854
L. mexicanus subsp. *mexicanus* Duméril, Bribon & Duméril, 1854
L. modestus (Günther, 1872)
Género *Manolepis* Cope, 1885
M. putnami (Jan, 1863)
Género *Masticophis* Baird & Girard, 1853
M. anthonyi Stejneger, 1901
M. aurigulus (Cope, 1861)
M. barbouri Van Denburgh & Slevin, 1821
M. bilineatus Jan, 1863
M. flagellum (Shaw, 1802)
M. fuliginosus (Cope, 1895)

- M. lateralis* (Hallowell, 1853)
M. mentovarius (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
M. mentovarius subsp. *mentovarius* (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
M. schotti Baird & Girard, 1853
M. slevini Lowe & Norris, 1955
M. taeniatus (Hallowell, 1852)
 Género *Nerodia* Baird & Girard, 1853
N. erythrogaster (Forster, 1771)
N. rhombifer (Hallowell, 1852)
 Género *Ninia* Baird & Girard, 1853
N. diademata Baird & Girard, 1853
N. sebae (Duméril Bibron & Duméril, 1854)
 Género *Opheodrys* Fitzinger, 1843
O. aestivus (Linnaeus, 1766)
O. vernalis (Harlan, 1827)
 Género *Oxybelis* Wagler, 1830
O. aeneus (Wagler, 1824)
O. fulgidus (Daudin, 1803)
 Género *Oxyrhopus* Wagler, 1830
O. petola (Linnaeus, 1758)
 Género *Pantherophis* Fitzinger, 1843
P. bairdi Yarrow, 1880
P. guttatus Linnaeus, 1766
 Género *Phyllorhynchus* Stejneger, 1890
P. browni Stejneger, 1890
P. decurtatus (Cope, 1868)
 Género *Pituophis* Holbrook, 1842
P. catenifer Blainville, 1835
P. deppei (Duméril, 1853)
P. insulanus (Klauber, 1946)
P. lineaticollis (Cope, 1861)
P. melanoleucus Daudin, 1803
P. vertebralis Blainville, 1835
 Género *Pliocercus* Cope, 1860
P. andrewsi Smith, 1942
P. bicolor Smith, 1941
P. elapoides Cope, 1860
P. wilmarai Smith, Pérez-Higareda & Chiszar, 1996
 Género *Pseudelaphe* Mertens & Rosenberg, 1943
P. flavirufa Cope, 1867
P. phaescens Dowling, 1952
P. uribei Ramírez-Bautista & Smith, 1992
 Género *Pseudoficimia* Bocourt, 1883
P. frontalis (Cope, 1864)
 Género *Pseudoleptodeira* Taylor, 1938
P. latifasciata (Günther, 1894)
P. uribei Ramírez-Bautista & Smith, 1992
 Género *Pseustes* Fitzinger, 1843
P. poecilnotus (Günther, 1858)
 Género *Rhadinaea* Cope, 1868
R. bogertorum Myers, 1974
R. cuneata Myers, 1974
R. decorata (Günther, 1858)
R. forbesi Smith, 1942
R. fulvivittis Cope, 1875
R. gaigeae Bailey, 1937
R. godmani (Günther, 1865)
R. hannsteini (Stuart, 1949)

- R. hesperia* Bailey, 1940
R. kanalchutchan Mendelson III, J. R. & D. A. Kizirian, 1995
R. kinkelini Boettger, 1898
R. lachrymans (Cope, 1870)
R. laureata (Günther, 1868)
R. macedougalli Smith & Langebartel, 1950
R. marcellae Taylor, 1949
R. montana Smith, 1944
R. myersi Rossman, 1965
R. omiltemana (Günther, 1894)
R. posadasii (Slevin, 1936)
R. quinquelineata Cope, 1886
R. schistosa (Smith, 1941)
R. taeniata (Peters, 1863)
Género *Rhadinophanes* Myers & Campbell, 1981
R. monticola Myers & Campbell, 1981
Género *Rhinocheilus* Baird & Girard, 1853
R. etheridgei Grismer, 1990
R. lecontei Baird & Girard, 1853
Género *Salvadora* Baird & Girard, 1853
S. bairdi Jan, 1860
S. deserticola Schmidt, 1940
S. grahamiae Baird & Girard, 1853
S. hexalepis (Cope, 1866)
S. intermedia Hartweg, 1940
S. lemniscata (Cope, 1890)
S. mexicana (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
Género *Scaphiodontophis* Taylor & Smith, 1943
S. annulatus (Duméril, Bribon & Duméril, 1854)
Género *Senticolis* Dowling & Fries, 1987
S. triaspis (Cope, 1866)
Género *Sibon* Fitzinger, 1826
S. dimidiata (Günther, 1872)
S. linearis Pérez-Higareda, López-Luna & Smith, 2002
S. nebulata (Linnaeus, 1758)
S. sanniola (Cope, 1866)
Género *Sonora* Baird & Girard, 1853
S. aemula (Cope, 1879)
S. michoacanensis Dugès, 1884
S. semiannulata Baird & Girard, 1853
Género *Spilotes* Wagler, 1830
S. pullatus (Linnaeus, 1758)
Género *Stenorrhina* Duméril, 1853
S. degenhardti Berthold, 1846
S. freminvillei Duméril, Bribon & Duméril, 1854
Género *Storeria* Baird & Girard, 1853
S. dekayi (Holbrook, 1842)
S. hidalgoensis Taylor, 1942
S. storerioides (Cope, 1865)
Género *Symphimus* Cope, 1869
S. leucostomus Cope, 1869
S. mayae (Gaige, 1936)
Género *Sympholis* Cope, 1862
S. lippiens Cope, 1862
Género *Tantalophis* Duellman, 1958
T. discolor (Günther, 1860)
Género *Tantilla* Baird & Girard, 1853
T. atriceps (Günther, 1895)

- T. bocourti* (Günther, 1895)
T. briggsi Savitzky & Smith, 1971
T. calamarina Cope, 1866
T. cascadeae Wilson & Meyer, 1981
T. coronadoi Hartweg, 1944
T. cuniculator Smith, 1939
T. deppei (Bocourt, 1883)
T. flavilineata Smith & Burger, 1950
T. gracilis Baird & Girard, 1853
T. hobartsmithi Taylor, 1937
T. impensa Campbell, 1998
T. jani (Günther, 1895)
T. johnsoni Wilson, L. D., R. K. Vaughan & J. R. Dixon, 1999
T. moesta (Günther, 1863)
T. nigriceps Kennicott, 1860
T. oaxacae Wilson & Meyer, 1971
T. planiceps (Blainville, 1835)
T. robusta Canseco-Márquez, Mendelson III & Gutiérrez-Mayén, 2002
T. rubra Cope, 1876
T. schistosa (Bocourt, 1883)
T. sertula Wilson, L. D. & J. A. Campbell, 2000
T. shawi Taylor, 1949
T. slavensi Pérez-Higareda, Smith & Smith, 1985
T. striata Dunn, 1928
T. tayrae Wilson, 1983
T. triseriata Smith & Smith, 1951
T. vulcani Campbell, 1998
T. wilcoxi Stejneger, 1902
T. yaquia Smith, 1942
- Género *Tantillita* Smith, 1941
- T. brevissima* (Taylor, 1937)
T. canula Cope, 1875
T. lintoni (Smith, 1940)
- Género *Thamnophis* Fitzinger, 1843
- T. chrysocephalus* (Cope, 1885)
T. cyrtopsis (Kennicott, 1860)
T. elegans (Baird & Girard, 1853)
T. eques (Reuss, 1834)
T. errans Smith, 1942
T. exsul Rossman, 1969
T. fulvus (Bocourt, 1893)
T. godmani (Günther, 1894)
T. hammondii (Kennicott, 1860)
T. marcianus (Baird & Girard, 1853)
T. melanogaster (Peters, 1864)
T. mendax Walker, 1955
T. nigronuchalis Thompson, 1957
T. postremus Smith, 1942
T. proximus (Say, 1823)
T. pulchrilatus (Cope, 1885)
T. rossmani Conant, 2000
T. rufipunctatus Cope, 1875
T. scalaris Cope, 1861
T. scaliger (Jan, 1863)
T. sirtalis (Linnaeus, 1758)
T. sumichrasti (Cope, 1866)
T. valida (Kennicott, 1860)

Género *Tretanorhinus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854

T. nigroluteus Cope, 1861

Género *Trimorphodon* Cope, 1869

T. wilkinsonii Cope, 1886

Género *Tropidodipsas* Guenther, 1858

T. annulifera Boulenger, 1894

T. fasciata Günther, 1858

T. fischeri Boulenger, 1894

T. philippii (Jan, 1863)

T. sartorii Cope, 1863

T. wilkinsonii Cope, 1886

T. zweifeli Liner & Wilson, 1970

Género *Xenodon* Boie, 1826

X. rabdocephalus (Wied, 1824)

Familia Elapidae

Género *Micruroides* Schmidt, 1928

M. euryxanthus (Kennicott, 1860)

Género *Micrurus* Wagler, 1824

M. bernadi Cope, 1887

M. bogerti Roze, 1967

M. browni Schmidt & Smith, 1943

M. diastema (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

M. distans (Kennicott, 1860)

M. elegans (Jan, 1858)

M. ephippifer (Cope, 1886)

M. fulvius (Linnaeus, 1766)

M. laticollaris (Peters, 1869)

M. latifasciatus Schmidt, 1933

M. limbatus Fraser, 1964

M. nebularis Roze, 1989

M. nigrocinctus (Girard, 1854)

M. pachecogili Campbell, 2000

M. proximans Smith & Chrapliwy, 1958

Género *Pelamis* Daudin, 1803

P. platurus (Linnaeus, 1766)

Familia Leptotyphlopidae Stejneger, 1892

Género *Leptotyphlops* Fitzinger, 1843

L. bressoni Taylor, 1939

L. dissectus Cope, 1896

L. dulcis (Baird & Girard, 1853)

L. dulcis subsp. *dulcis* (Baird & Girard, 1853)

L. goudotii Duméril & Bibron, 1844

L. goudotii subsp. *pheops* (Cope, 1876)

L. humilis (Baird & Girard, 1853)

L. humilis subsp. *boettgeri* (Werner, 1899)

L. humilis subsp. *cahuilae* Klauber, 1931

L. humilis subsp. *chihuahuaensis* Tanner, 1885

L. humilis subsp. *levitoni* Murphy, 1975

L. humilis subsp. *lindsayi* Murphy, 1975

L. maximus Loveridge, 1932

L. myopicus Garman, 1883

Familia Loxocemidae Cope, 1861

Género *Loxocemus* Cope, 1861

L. bicolor Cope, 1861

Familia Tropicopidae

Género *Exiliboa* Bogert, 1968

E. placata Bogert, 1968

géneros: 3, especies: 17

géneros: 1, especies: 7

géneros: 1, especies: 1

géneros: 2, especies: 2

- Género *Ungaliophis* Müller, 1882
U. continentalis Müller, 1882
- Familia Typhlopidae Merrem, 1820 géneros: 2, especies: 2
 Género *Ramphotyphlops* Fitzinger, 1843
R. braminus (Daudin, 1803)
- Género *Typhlops* Oppel, 1811
T. microstomus Cope, 1866
- Familia Viperidae Oppel, 1811 géneros: 9, especies: 51
 Género *Agkistrodon* de Beauvois, 1799
A. bilineatus Günther, 1863
A. contortrix (Linnaeus, 1766)
A. taylori Burger & Robertson, 1951
- Género *Atropoides* Werman, 1992
A. nummifer (Rüppell, 1845)
A. olmec (Pérez-Higareda, Smith & Juliá-Zertuche, 1985)
- Género *Bothriechis* Peters 1859
B. aurifer (Salvin, 1860)
B. bicolor (Bocourt, 1868)
B. rowleyi (Bogert, 1968)
B. schlegeli (Berthold, 1846)
- Género *Bothrops* Spix & Martius 1823
B. asper Garman, 1883
- Género *Cerrophidion* Campbell & Lamar 1992
C. barbouri Dunn, 1919
C. godmani Günther, 1863
C. petlalcalensis López-Luna, M. A., R. C. Vogt & M. A. de la Torre-Loranca, 1999
C. tzotzilorum (Campbell, 1985)
- Género *Crotalus* Linnaeus, 1758
C. angelensis Klauber, 1963
C. aquilus Klauber, 1952
C. atrox Baird & Girard, 1853
C. basiliscus (Cope, 1864)
C. catalinensis Cliff, 1954
C. cerastes Hallowell, 1854
C. durissus Linnaeus, 1758
C. enyo (Cope, 1861)
C. enyo subsp. *cerralvensis* Cliff, 1954
C. enyo subsp. *enyoy* (Cope, 1861)
C. enyo subsp. *fervus* Lowe & Norris, 1954
C. estebanensis Klauber, 1949
C. intermedius Troschel en Müller, 1865
C. lannomi Tanner, 1966
C. lepidus (Kennicott, 1861)
C. lorenzoensis Radcliffe & Maslin, 1975
C. mitchellii (Cope, 1861)
C. mitchellii subsp. *mitchellii* (Cope, 1861)
C. mitchellii subsp. *pyrrhus* (Cope, 1867)
C. molossus Baird & Girard, 1853
C. muertensis Klauber, 1949
C. oreganus Holbrook, 1840
C. oreganus subsp. *caliginis*
C. polystictus (Cope, 1865)
C. pricei Van Denburgh, 1895
C. pusillus Klauber, 1952
C. ravus Cope, 1865
C. ruber Cope, 1892
- Sinónimos
Crotalus exsul Garman, 1883
C. ruber subsp. *lucasensis* Van Denburgh, 1920

- C. ruber* subsp. *ruber* Cope, 1892
C. scutulatus (Kennicott, 1861)
C. stejnegeri Dunn, 1919
C. tigris Kennicott, 1859
C. tortugensis Van Denburgh & Slevin, 1921
C. transversus Taylor, 1944
C. triseriatus (Wagler, 1830)
C. viridis Rafinesque, 1818
C. willardi Meek, 1905
 Género *Ophryacus* Cope, 1887
O. melanurum Müller, 1923
O. undulatus (Jan, 1859)
 Género *Porthidium* Cope, 1871
P. dunni (Hartweg & Oliver, 1938)
P. hespere Campbell, 1976
P. nasutum (Bocourt, 1868)
P. yucatanicum (Smith, 1941)
 Género *Sistrurus* Garman, 1883
S. catenatus (Rafinesque, 1818)
- Orden Testudines Linnaeus, 1758
- Familia Bataguridae géneros: 1, especies: 3
- Género *Rhinoclemmys* Fitzinger, 1835
R. areolata (Duméril & Bribon, 1851)
R. pulcherrima (Gray, 1855)
R. rubida (Cope, 1870)
- Familia Cheloniidae géneros: 4, especies: 5
- Género *Caretta* Rafinesque, 1814
C. caretta (Linnaeus, 1758)
C. caretta subsp. *gigas*
 Género *Chelonia* Brongniart, 1800
C. mydas (Linnaeus, 1758)
 Género *Eretmochelys* Fitzinger, 1843
E. imbricata (Linnaeus, 1766)
 Género *Lepidochelys* Fitzinger, 1843
L. kempii (Garman, 1880)
L. olivacea (Eschscholtz, 1829)
- Familia Chelydridae géneros: 1, especies: 1
- Género *Chelydra* Schweigger, 1812
C. serpentina (Linnaeus, 1758)
- Familia Dermatemydidae Gray, 1870 géneros: 1, especies: 1
- Género *Dermatemys* Gray, 1847
D. mawii Gray, 1847
- Familia Dermochelyidae Fitzinger, 1843 géneros: 1, especies: 1
- Género *Dermochelys* Blainville, 1816
D. coriacea (Vandelli, 1761)
 Sinónimos
Dermochelys coriaceaschlegelii (Garman, 1884)
- Familia Emydidae Rafinesque, 1815 géneros: 4, especies: 13
- Género *Chrysemys* Gray, 1844
C. picta (Schneider, 1783)
 Género *Pseudemys* Gray, 1855
P. gorzugi Ward, 1984
 Género *Terrapene* Merrem, 1820
T. carolina (Linnaeus, 1758)
T. coahuila Schmidt & Owens, 1944
T. nelsoni Stejneger, 1925
T. ornata (Agassiz, 1857)
 Género *Trachemys* Agassiz, 1857
T. gaigeae Hartweg, 1939

- T. nebulosa* Van Denburgh, 1895
T. ornata Gray, 1831
T. scripta (Schoepf, 1792)
T. taylori Legler, 1960
T. venusta Gray, 1855
T. yaquia Legler & Webb, 1970
- Familia Kinosternidae géneros: 3, especies: 17
- Género *Claudius* Cope, 1865
C. angustatus Cope, 1865
 Género *Kinosternon* Spix, 1824
K. acutum Gray, 1831
K. alamosae Berry & Legler, 1980
K. arizonense Gilmore, 1922
K. chimalhuaca Berry, Siedel & Iverson, 1997
K. creaseri Hartweg, 1934
K. durangoense Iverson, 1979
K. flavescens (Agassiz, 1857)
K. herrerae Stejneger, 1925
K. hirtipes Wagler, 1830
K. integrum Le Conte, 1854
K. leucostomum (Duméril & Bribon, 1851)
K. oaxacae Berry & Iverson, 1980
K. scorpoides (Linnaeus, 1766)
K. sonoriense Le Conte, 1854
 Género *Staurotypus* Wagler, 1830
S. salvini Gray, 1864
S. triporcatus (Wiegmann, 1828)
- Familia Testudinidae Batsch, 1788 géneros: 1, especies: 3
- Género *Gopherus* Rafinesque, 1832
G. agassizii (Cooper, 1863)
G. berlandieri (Agassiz, 1857)
G. flavomarginatus Legler, 1959
- Familia Trionychidae Fitzinger, 1826 géneros: 1, especies: 2
- Género *Apalone* Rafinesque, 1832
A. ater (Webb & Legler, 1960)
A. spinifera (Le Sueur, 1827)

Referencias

- Flores-Villela, O. 1993. *Herpetofauna Mexicana. Lista anotada de las especies de anfibios y reptiles de México, cambios taxonómicos recientes y nuevas especies* Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh
- Flores-Villela, O. y L. Canseco-Márquez. 2004. Nuevas especies y cambios taxonómicos para la herpetofauna de México *Acta Zool. Mex.* 20:115-144.
- Flores-Villela, O. y L. Canseco-Márquez. 2008. Actualización del catálogo de autoridad taxonómica de la herpetofauna de México. Museo de Zoología, Fac. de Ciencias, UNAM. Base de datos SNIB-CONABIO, proyecto CS003 (en seguimiento).
- Liner, Ernest A. 2007. A checklist of the Amphibians and Reptiles of México. *Occasional Papers of the Museum of Natural Science.* (80): 1-60.