

Figura 15.1. *Chloeia entypa*: a) Organismo completo, vista dorsal; b) Región anterior, vista dorsal; c) Seta notopodial dorsal aserrada; d) Porción media de la seta notopodial; e) Región distal de una seta; f) Seta notopodial lisa del parapodio 4; g) seta notopodial aserrada de, parapodio 10; h) Punta de una seta notopodial del parapodio medio; i) Parapodio del setígero 8. Figs. b-h: tomadas de Hartman 1940.




Figura 15.2. *Chloeia viridis*: a) Organismo completo; b) Branquia típica; c) Notoseta arpón; d) Notoseta bifida aserrada; e) Neuroseta bifida lisa; f) Parapodio del sétigero 8. Figs. b-c: tomadas de Gathof 1984.




Figura 15.3. *Linopherus ambigua*: a) Región anterior, vista ventral; b) Región anterior., vista dorsal; c) Región anterior, vista anterior; d) Neuroseta furcada. Fig. a: tomada de Hartman 1968, Figs. b-d: tomadas de Gardiner 1976.




Figura 16.1. *Euphrosine arctia*: a) Organismo completo, vista dorsal; b) Parapodio 10; c) Notoseta bifida; d) Neuroseta simple bífida; e) Branquia típica. Figs. c-e: tomadas de Johnson 1897.




Figura 17.1. *Diopatra obliqua*: a) Región anterior, vista ventral; b) Segundo parapodio; c) Primer parapodio; d) Gancho cubierto subacicular; e) Región distal de una seta limbada; f) Seta pectinada de un parapodio anterior; g) Región distal de un gancho bidentado. Figs. a, b, d-g: tomadas de Hartman 1944d; Fig. c: tomada de Fauchald 1968.




Figura 17.2. *Diopatra ornata*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Primer parapodio; c) Parapodio de la región anterior; d) Gancho cubierto bívido; e) Gancho subacicular; f) Maxila. Figs. c-f: tomadas de Hartman 1944d; Fig. b: tomada de Fauchald 1968.




Figura 17.3. *Diopatra papillata*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del primer setígero; c) Setígero 2; d) Setígero 3; e) Gancho bidentado del setígero 6; f) Seta limbada del setígero 6; g) Gancho subaciclar superior; h) Gancho subaciclar inferior; i) Seta pectinada; j) Ceratóforos de los tetáculos occipitales. Figs. a-h: tomadas de Gathof 1984; Figs. i-j: tomadas de Fauchald 1968.




Figura 17.4. *Diopatra splendidissima*: a) Primer parapodio; b) Gancho bifido cubierto; c) Gancho subacicular; d) Seta pectinada; e) Seta limbada aserrada lateralmente; f) Acicula. Fig. a: tomada de Fauchald 1968; Figs. b-f: tomadas de Moore 1904.






Figura 17.5. *Diopatra tridentata*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista lateral; c) Setígero 2; d) Setígero 25; e) Setígero 5; f) Gancho pseudocompuesto del setígero 2; g) Seta pectinada; h) Seta capilar; i) Gancho subacicular. Figs. Tomadas de Gathof 1984.




Figura 17.6. *Hirsutonuphis acapulcensis*: a) Región anterior, vista lateral; b) Setígero 5; c) Setígero 15; d) Setígero 20; e) Gancho pseudocompuesto del setígero 5; f) Gancho subacicular del setígero 20.




Figura 17.7. *Hyalinoecia juvenalis*: a) Región anterior, vista dorsal; b, c) Primer setígero; d) Setígero 25; e) Gancho cubierto del segundo parapodio; f) Gancho subacicular, parapodio 30; g) Seta limbada simple. Figs. a-c, e, f: tomadas de Fauchald 1968; Figs. d, g: tomadas de Moore 1911.




Figura 17.8. *Kinbergonuphis cedroensis*: a) Región anterior, vista lateral; b) Setígero 6; c) Gancho tridentado pseudocompuesto del setígero 4; d) Ganchos simples del setígero 6.




Figura 17.9. *Kinbergonuphis microcephala*: a) Región anterior, vista lateral; b) Segmento 2; c) Segmento 58 con branquias; d) Gancho cubierto trífido; e) Gancho subacicular; f) Gancho subacicular trífido. Fig. a: tomada de Fauchald 1982; Figs. b-f: tomadas de Hartman 1944.




Figura 17.10. *Kinbergonuphis proalopus*: a) Región anterior, vista lateral; b) Primer parapodio; c) Parapodio 7; d) Gancho cubierto inferior; e) Gancho cubierto superior; f) Gancho subacicular; g) Seta pectinada, parapodio posterior. Fig. a: tomada de Fauchald 1982; Figs. b-g: tomas de Fauchald 1968




Figura 17.11. *Kinbergonuphis pulchra*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Primer setígero; c) Setígero 4; d) Setígero 7; e) Gancho pseudocompuesto del setígero 4; f) Gancho i pseudocompuesto del setígero 5; g) Gancho pseudocompuesto del setígero 6; h) Gancho largo del setígero 4; i) Seta pectinada. Figs. Tomadas de Fauchald 1980.




Figura 17.12. *Kinbergonuphis vermilionensis*: a) Región anterior, vista dorsolateral; b) Parapodio c) Primer parapodio; d) Gancho cubierto parapodio 7; e) Gancho cubierto, primer parapodio; f) Gancho simple tridentado; g) Gaucho subacicular. Figs. b-g: tomadas de Fauchald 1968.






Figura 17.1.3. *Kinbergonuphis virgata*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Setígero 3; c) Setígero 9; d) Setígero 12; e) Gancho pseudocompuesto del setígero 3; f, g) Ganchos pseudo compuesto del setígero 7; h-j) Ganchos largos, (h) Del setígero 12; (i) Del setígero 6; (j) Del setígero 7. Figs. Tomadas de Fauchald 1980.




Figura 17.14. *Mooreonuphis elsiae*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Primer parapodio, vista anterior; c) Parapodio 5; d) Parapodio posterior; e, f) Ganchos pseudo compuestos del primer parapodio; g) Gancho tridentado simple; h) Gancho subacicular; i) Espinigerio compuesto. Figs. Tomadas de León-González




Figura 17.15. *Mooreonuphis ca. guadalupensis*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Setígero 4; c) Setígero 11; d) Setígero 20; e) Gancho pseudocompuesto del setígero 4, vista lateral; f) Espiniger compuesto, setígero 11; g) Gaucho subacicular, setígero 20.




Figura 17.16. *Mooreonuphis nebulosa*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Primer setígero; c) Setígero 6; d) Setígero 25; e) Seta pseudocompuesta superior; f) Seta pseudocompuesta central, larga; g) Espiniger compuesto; h) Gancho largo del setígero 6; i) Gancho subcircular. Figs. a-f, h i: tomadas de Gathof 1984; Fig. g: tomada de Hartman 1944d.




Figura 17.17. *Onuphis eremita oculata*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista lateral; c) Primer setígero; d) Setígero 25; e) Gancho pseudocompuesto superior, setígero 2; f) pseudocompuesto inferior, setígero 2; g) Setígero 4; h) Gancho subacicular. Figs. Tomadas de Gathof 1984.




Figura 17.18. *Onuphis eremita parva*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 4; c) Parapodio 6; d) Ganchos pseudocompuestos del parapodio 4; c) Parapodio 12; f) Gancho simple parapodio 12.




Figura 18.1. *Eunice mexicana*: a) Organismo completo, vista dorsal; b) Setígero 3; c) Setígero 10; d) Setígero 24; e) Seta pectinada; f) Seta limbada; g) Gancho bidentado, vista lateral.




Figura 18.2. *Eunice vittata*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; c) Parapodio banquial; d) Parapodio posterior; e) Región posterior, vista dorsal; f) Seta pectinada; g) Falcigero compuesto; h) Gancho cubierto subacicular; i) Acicula. Figs. a-d, f-i: tomadas de Gathof 1984; e: tomada de Fauvel 1923.






Figura 18.3. *Eunice websteri*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; c) Parapodio branquial; d) Parapodio posterior; e) Seta pectinada; f) Seta limbada; g) Falcigero compuesto; h) Gancho cubierto subacicular; i) Acicula; j) Región posterior, vista dorsal. Figs. Tomadas de Gathof 1984.




Figura 18.4. *Lysidice ninetta*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; c) Parapodio posterior; d) Seta pectinada; e) Seta limbada; f) Falcígero compuesto; g) Gancho cubierto subacicular; h) Acicula. Figs. Tomadas de Gathof 1984.




Figura 18.5. *Marphysa conferta*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; Parapodio posterior; d) Parapodio con branquias; e) Seta pectinada; f) Falcígero compuesto anterior; g) Falcígero compuesto posterior; h) Seta capilar; i) Gancho cubierto subacicular; Acicula. Figs. a-g, e-j: tomadas de Gathof 1984; Fig. d: tomada de Moore 1911.




Figura 18.6. *Marphysa mortenseni*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; c) Parapodio posterior; d) Parapodio con branquias; e) Seta pectinada; f) Seta limbada; g) Falcígero compuesto; h) Gancho cubierto subacicular; i) Acicula. Figs. a-c, e-i: tomadas de Gathof 1984; I d: tomada de Monro 1928b.




Figura 18.7. *Nematonereis hebes*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Seta limbada; c) seta pectinada; d) Falcígero compuesto; e) Gancho cubierto subacicular. Figs. Tomadas de Gathof 1984.




Figura 19.1. *Eranno lagunae*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista ventral; c) Parapodio anterior, con setas; d) Parapodio 5; e) Parapodio 106; f) Maxila; g) Mandíbula; h) Gancho cubierto simple, setífero 106; i) Gancho cubierto, setífero 5; Figs. a, d, e, h, i: tomadas de Fauchald 1970; b, c, f, g: tomadas de Ehlers 1901.




Figura 19.2. *Lumbricalus dayi*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del setígero 10; c) Parapodio de la región media; d) Seta limbada simple de] setígero 6; e) Seta limbada compuesta del setígero 6; f) Gancho cubierto compuesto de la región media; g) Gancho cubieto simple de la región posterior; h) Maxila; i) Mandíbula. Figs. Tomadas de Uebelacker 1984.




Figura 19.3. *Lumbrinerides acutiformis*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio medio; c) Mandíbula; d) Aparato maxilar; e) Seta limbada; f) Gancho cubierto bidentado de un setígero anterior g) Gancho cubierto bidentado de un setígero posterior. Figs. Tomadas de Gallardo 1968.






Figura 19.4. *Lumbrinerides ?platypygos*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Gancho simple de setígero medio; c) Maxila; d) Parapodio de setígero medio; c) Parapodio 15 de la región anterior; t) Gancho cubierto del setígero medio. Figs. a-c: tomadas de Fauchald 1970.




Figura 19.5. *Lumbrineris crassidentata*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 2; c) Parapodio posterior; d) Gancho cubierto simple, segundo setífero; e) Gancho cubierto simple, setífero 200; f) Gancho cubierto simple, setífero 100. Figs. Tomadas de Fauchald 1970.




Figura 19.6. *Lumbrineris cruzensis*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 5; c) Parapodio posterior con lóbulos pre- y postsetales largos; d) Parapodio anterior; e) Maxila; f) Mandíbulas; g) Gancho cubierto simple, setífero 70; h) Gancho cubierto compuesto, setífero 5. Figs. a, b, g, i) tomadas de Fauchald 1970; Figs. c, e, f: tomadas de Hartman 1944d




Figura 19.7: *Lumbrineris erecta*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio anterior; c) Parapodio posterior con lóbulos postsetales elongados; d) Parapodio 5; e) Gancho cubierto del setígero posterior; f) Seta limbada. Figs. b, c, f: tomadas de Moore 1904; Figs. d, e: tomadas de Fauchald 1970.




Figura 19.8. *Lumbrineris latreilli*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 5; c) Parapodio anterior; d) Parapodio posterior; e) Gancho compuesto cubierto de un parapodio anterior; f) Gancho cubierto de un parapodio posterior; g) Maxila; h) Mandibula. Figs. a, e-h: tomadas de Orenzans 1973; Figs. c, d: tomadas de Gardiner 1976; Fig. b: tomada de Fauchald 1970.




Figura 19.9. *Lumbrineris limicola*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio posterior; c) Parapodio 5; d) Gancho cubierto compuesto; e) Gancho cubierto simple, setífero posterior; f) Apendice de un gancho compuesto, setífero 5; g) Mandíbula; h) Maxila. Figs. d, g, h: tornadas Hartman 1944d; b, c, e, f: tomadas de Fauchald 1970.




Figura 19.10. *Lumbrineris platylobata*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 75; c) Parapodio 20; d) Gancho simple cubierto, setífero 75; e) Gancho simple cubierto, setífero 20. Figs. Tomadas de Fauchald 1970.




Figura 19.11. *Lumbrineris tetraura*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 5; c) Parapodio posterior, d) Gancho cubierto simple, setífero 5; e) Gancho cubierto simple, setífero posterior f) Maxila; g) Mandíbula. Figs. b-e: tomadas de Fauchald 1970; Figs. f, g: tomadas de Hartman 1944d.






Figura 19.12. *Lumbrineris zonata*: a) Región anterior, vista dorsal; h) Parapodio 5; c) Parapodio posterior; d) Gancho simple, primer setífero; e) Gancho simple, setífero 5; f) Gancho cubierto simple, setífero posterior. Fig. a: tomada de Hartman 1944d; Figs. b-f: tomas de Fauchald 1970.




Figura 19.3. *Ninoe foliosa*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio 19, vista anterior setas omitidas; c) Parapodio 19, vista posterior; d) Parapodio posterior; e) Gancho simple, setífero posterior; f) Maxila. Figs. Tomadas de Fauchald 1972a.




Figura 20.1 *Arabella (Arabella) iricolor*: a) Región anterior, vista ventral; b) Parapodio del setífero 8. c) Parapodio de la región media del cuerpo; d) Parapodio posterior; e) Seta limbada de la región media del cuerpo; f) Seta limbada, marginalmente aserrada; g) Maxilas; h) Mandibulas. Figs. a-c, g,h: tomadas de Uebelacker 1984; Fig. f: tomada de Fauvel 1923; Fig. d: tomada de Fauchald 1970.




Figura 20.2. *Drilonereis falcata*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Neuropodio anterior; c) Parapodio posterior; d) Parapodio medio; e) Maxilas; f) Mandíbulas; g) Seta limbada; h) Acicula, región distal. Figs. a, f, h: tomadas de Day 1967; b, c, e, g: tomadas de Moore 1911; Fig. d: tomada Fauchald 1970.




Figura 20.3. *Drilonereis longa*: a) Región anterior; b) Parapodio del setígero 6; c) Parapodio de región media del cuerpo; d) Aparato maxilar; e) Detalle de la maxila. Figs. Tomadas de Uebelacker 1984.




Figura 21.1. *Dorvillea moniloceras*: a) Organismos completo, vista dorsal; b) Primer parapodio; c) Parapodio medio; d) Falcígero con terminación bífida; e) Seta subacicular compuesta. Figs. d, e: tomadas de Moore 1909.




Figura 21.2. *Schistomeringos longicornis*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio medio; c) Parapodio posterior; d) Seta superior simple; e) Seta inferior compuesta. Fig. a: tomada de Fauvel 1923; Figs. b-e: tomadas de Hartman 1938.




Figura 22.1. *Leitoscoloplos mexicanus*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Octavo parapodio; c-e) Setígeros 9, 10 y 16, sin setas; f) Parapodio abdominal. Figs. a, c-e: tomadas de Mackie 1987; Figs. b,f: tomadas de Fauchald 1972a






Figura 22.2. *Leitoscoloplos panamensis*: a) Región anterior, vista lateral; b-d) Setígeros 6, 15 y posterior, sin setas; c) Setígeros 16 a 23 con papilas subparapodiales y estomacales. Figs. a-d: Tomadas de Mackie 1987.




Figura 22.3. *Leitoscoloplos pugettensis*: a) Región anterior, vista lateral; b) Región anterior, vista dorsal; c) Primer setígero; d-f) Setígeros 10, 15 y 19; g) Parapodio abdominal; h) Parapodio abdominal; i) Neuroseta torácica; j) Seta furcada de parapodio abdominal. Figs. a, h, d-f: tomadas de Mackie 1987; Figs. c, g-j: tomadas de Hartman 1960.




Figura 22.4. *Naineris grubei*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Cuarto parapodio; c) Gancho neuropodial torácico; d) Vigésimo parapodio; e) Seta furcada neuropodial abdominal; f) Notoseta acicular abdominal. Figs. Tomadas de Taylor 1984.




Figura 22.5. *Orbinia riseri*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Sexto setígero; c) Décimo octavo parapodio torácico; d) Parapodio abdominal posterior; e) Espina neuropodial torácica; f) Espina neuropodial abdominal. Figs. a, c-e: tomadas de Day 1973; Fig. b: tomada de Pettibone 1963a; Fig. f: tomada de Taylor 1984.




Figura 22.6. *Scololoplos (Leodamas) ohlini*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Quinto setífero torácico; c) Parapodio abdominal; d) Seta furcada del décimo octavo notopodio torácico; e) Gancho neuropodial torácico del décimo octavo parapodio; f) Neuroacícula de parapodio posterior. Figs. d-f: tomadas de Hartman 1957.




Figura 22.7. *Scololoplos (Scoloplos) armiger*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región de transición, segmentos 16 a 24; c) Parapodio torácico; d) Doceavo parapodio torácico; e) Parapodio abdominal anterior; f) Parapodio abdominal medio; g) Seta crenulada; h) Gancho neuropodial torácico. i) Seta furcada abdominal. Figs. a, g: tomadas de Fauvel 1927; Figs. c, i: tomadas de Day 1967; Figs. b, d, e, f, h: tomadas de Hartman 1969.




Figura 22.8. *Scoloplos capensis*: a) Región anterior, vista dorsal; h) Décimo parapodio torácico; c) Quinto parapodio abdominal; d) Gancho neuropodial torácico; e) Neuroseta gruesa, crenulada, abdominal. Figs. Tomadas de Day 1973.




Figura 22.9. *Scoloplos (Scoloplos) texana*: a) Región anterior, vista dorsolateral; b) Décimo setífero torácico; c) Parapodio posterior; d) Gancho neuropodial torácico; e) Notoseta furcada abdominal. Figs. a-c: tomadas de Maciolek y Holland 1978; Figs. d, e: tomadas de Taylor 1984.






Figura 23.1. *Aricidea (Acmira) catherinae*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del sexto segmento; c) Parapodio anterior; d) Setas modificadas; e) Setas ventrales del segmento 64. Figs. Tomadas de Strelzov 1979.




Figura 23.2. *Aricidea (Acmira) cerrutti*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista lateral; c) Parapodio del segmento 7; d) Parapodio branquial; e, f) Setas modificadas; g) Neuroseta del segmento 8. Fig. a: tomada de Gaston 1984; Figs. b, c, e-g: tomadas de Strelzov 1979; Fig. d: tomadas de Day 1967.




Figura 23.3. *Aricidea (Acmira) lopezi*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del segmento 7; c) Parapodio del segmento 8; d) Parapodio del segmento 25; e) Parapodio posterior; f) Neuroseta modificada. Fig. a: tomada de Gaston 1984; Figs. b-e: tomas de Strelzov 1979; Fig. f: tomada de Day 1967.




Figura 23.4. *Aricidea (Acmira) simplex*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del segmento 8; c) Parapodio del setígero 12; d) Neuropodio posterior; e) Neuroseta modificada. Figs. a, c, e: tomadas de Gaston 1984; Figs. b, d: tomadas de Strelzov 1979.




Figura 23.5. *Aricidea (Aedicira) pacifica*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista ventral; c) Parapodio del segmento 10; d) Parapodio posterior; e, f) Notosetas modificadas, con arista distal. Figs. a-d: tomadas de Strelzov 1979; Figs. e, f: tomadas de Hartman 1969.




Figura 23.6. *Aricidea (Allia) suecica*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del setígero 7; c) Neuroseta modificada del setígero 28; d) Neuroseta modificada del setígero 36; e) Neuroseta modificada del setígero 55. Figs. Tomadas de Gaston 1984.




Figura 23.7. *Aricidea (Aricidea) fragilis*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio del segmento 12; c) Parapodio del segmento 17; d) Parapodio posterior; e) Neurosetas pseudoarticuladas postbranquiales; f) Setas modificadas; g) Neurosetas posterior, mostrando la articulación. Figs. a, e: tomadas de Gaston 1984; Figs. b-d, f: tomadas de Strelzov 1979; Fig. g: tomada de Hartman 1947.




Figura 23.8. *Cirrophorus branchiatus*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Sexto segmento, vista lateral; c) Setígero 10; d) Branquias; e-g) Setas modificadas. Figs. a, c, e: tomadas de Gaston 1984.; Figs. b, d, f, g: tomadas de Strelzov 1979.






Figura 23.9. *Cirrophorus furcatus*. a) Región anterior, vista dorsal; b) Lóbulos parapodiales de los tres primeros segmentos; c-e) Lóbulos notopodiales y branquias de los segmentos medios; f) Seta furcada notopodial, abdominal; g) Setígero veinte; b) Seta capilar delgada. Figs. a-e: tomadas de Strelzov 1979; Fig. f: tomada de Hartman 1969.




Figura 23.10. *Paradoneis lyra*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, lateral; c) Cuarto setígero; d) Setígero 7; e) Setígero 16; f) Seta furcada. Fig. a: tomada de Hartman 1969; Figs. b, d-f: tomadas de Mackie 1991; Fig. c: tomada de Fauvel 1927.




Figura 23.11. *Levinsenia oculata*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista dorsal; c) Parapodio del tercer segmento branquial; d) Segmento branquial; e) Parapodio anterior; f) Parapodio posterior g) Neurosetas aciculares posteriores. Figs. a-c, e: tomadas de Strelzov 1979; Figs. d, f, g: tomadas de Day 1967.




Figura 31.1. *Brada villosa*: a) Organismo completo; b) Nefrideos ventrales en el setígero 5; c) Sección transversal de setígero medio; e) Neuropodio del setígero 18; f) Papila dorsal larga; g) Papila pequeña a nivel del neuropodio; h) Notoseta; i) Neuroseta. Figs. a, c-e: tomadas de Milligan 1984; b, f-i: tomadas de Moore 1906 y Berkeley y Berkeley 1952.




Figura 3.1.2. *Diplocirrus capensis*: a) Organismo completo, vista dorsal; b) Papila de la superficie ventral; c) Papila de la superficie dorsal; d) Notopodio del setígero 6; e) Neuropodio del setígero 6; Notoseta; g) Neuroseta de la región distal; h) Notoseta. Figs. a, d, e, g, h: tomadas de Milligan 1984; b, c, f: tomadas de Day 1967.




Figura 31.3. *Piromis arenosus*: a) Organismos completo; b) Región anterior, vista ventral; c) Región distal de una seta de un segmento medio; d) Parapodio de la región media; c) Neuropodio; f) Ganchos neuropodiales. Figs. a, b, f: tomadas de Day 1967; Figs. c e: tomadas de Hartman 1948a.




Figura 33.1. *Sternaspis fossor*: a) Organismo completo, vista ventral; b) Porción anterior; c) Espinas gruesas de setígeros anteriores; d) Setas puntiguas posteriores.




Figura 36.1. *Owenia collaris*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista ventral; c) Uncino con dos dientes largos, vista frontal; d) El mismo, vista lateral. Figs. Tomadas de Hartman 955. 1969.






Figura 37.1. *Amphicteis scaphobranchiata*: a) Organismo completo; b) Prostomio; c) Tentáculos orales, d) Parapodio abdominal; e) Palea terminada en punto; f) Branquia foliosa con terminación en gancho; g) Uncino torácico; h) Uncino abdominal anterior; i) Uncino abdominal posterior. Figs. a, d, g-i: tomadas de Uebelacker 1984; Figs. b, c., e, f: tomadas de Moore 1906.




Figura 37.2. *Asabellides lineata*: a) Región anterior, vista lateral; b) Seta abdominal. c) Gancho abdominal; d) Gancho torácico.




Figura 37.3. *Eclysippe vanelli*: a) Región anterior, vista lateral; b) Región anterior, vista dventro-lateral; c) Región anterior, vista dorsal; d) Palea; e) Palea; e) Notopodio del último segmento torácico; f) Notoseta; g) Pigidio, vista ventral; h) Uncino torácico; i) Uncinos abdominales. Figs. Tomadas de Holthe 1986b.




Figura 37.4. *Isolda pulchella*: a) Región anterior, vista dorsolateral; b) Región anterior, con tentáculos; c) Segmentos III y VI, vista lateral; d, e) Uncino torácico; f) Uncino abdominal anterior; g) Uncino abdominal posterior. Figs. a, c-g: tomadas de Uebelacker 1984; Fig. b: tomada de Day 1967.




Figura 37.5. *Lysippe annectens*: a) Región anterior con branquias, vista dorsal; b) Región posterior con cirro anal, vista ventral; c) Región anterior, vista ventral; d) Uncino torácico, vista frontal; e) Uncino torácico vista lateral; f) Uncino abdominal, vista lateral; g) Setígero 9, torácico. Fig a-f: tomadas de Moore 1923.




Figura 37.6. *Melinna oculata*: a) Región anterior, con branquias; b) Prostomio; c) Espina nual; d) Uncino torácico; e) Uncino abdominal. Figs. Tomadas de Hartman 1969.




Figura 37.7. *Samytha sexcirrata*: a) Organismos completo, vista lateral; b) Región anterior con branquias; c) Uncino con dientes en líneas múltiples; d) Región posterior, vista dorsal; e) Seta del parapodio 4. Figs. a-d: tomadas de Wollebaek 1912.




Figura 38.1. *Terebellides californica*: a) Región anterior, vista lateral; b) Seta acicular, setígero 6; c) Uncino torácico. Figs. Tomadas de Williams 1984.






Figura 38.2. *Terebellides reishi*: a) Organismo completo, vista lateral; b) Setígero 6; c) Gancho del setígero 6, vista lateral; d) Seta capilar; e) Ganchos de setígero abdominal, diferentes vistas.




Figura 38.3. *Trichobranchus bibranchiatus*: a) Organismo completo, vista lateral; b) Setígero 7; Ganchos del setígero 7, vista lateral; d) Seta capilar, setígero 7; c) Ganchos del setígero abdominal, diferentes vistas.




Figura 38.4. *Trichobranchus glacialis*: a) Organismo completo, vista lateral; b) Región anterior, vista dorsolateral; c) Notoseta proyectándose del notopodio torácico; d) Gancho rostrado neuropodial torácico; e) Uncino abdominal; f) Uncino abdominal, vista frontal. Fig. a: tomada de Holthe 1986b; b-f: tomadas de Kritzler 1984.




Figura 39.1. *Amaeana antipoda*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Parapodio torácico; c) Parapodio abdominal.




Figura 39.2. *Eupolytmnia nebulosa*: a) Región anterior, vista lateral; b) Notoseta; c) Uncino torácico, vista frontal; d) Uncino torácico, vista lateral: Fig. a: tomada de Day 1967; Figs. b-d: tomadas de Kritzler 1984.




Figura 39.3. *Lanice conchilega*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista ventral; c) Región anterior, vista lateral; d) Notoseta; e) Uncino torácico posterior, con doble arreglo de líneas; f) Uncino torácico del setífero 2, vista frontal; g) El anterior, vista lateral. Figs. a, b, d-g: tomadas de Kritzler 1984; Fig. c: tomada de Fauvel 1927 y Mc. Intosh 1922.




Figura 39.4. *Loimia medusa*: a) Región anterior, vista lateral; b) Región anterior, vista ventral; c) Notoseta; d) Uncino torácico del setígero 2, vista lateral; e) Uncino torácico del setígero 13 Figs. Tonadas de Kritzler 1984.




Figura 39.5. *Scionella japonica*: a) Región anterior, con tentáculos removidos, vista frontal; b) Región anterior, vista lateral; c) Uncino torácico, vista lateral; d) Uncinos torácicos, vista frontal lateral; e) Parapodio del setígero 11; f) Seta limbada del setígero 11. Fig. a: tomada de Moore 1903; Fig. b: tomada de Berkeley y Berkeley 1952; Fig. c: tomada de Hartman 1969.






Figura 39.6. *Streblosoma crassibranchia*: a) Región anterior, vista lateral; b) Uncino torácico, vista lateral; c) Uncino torácico, vista frontal; d) Uncino abdominal, vista lateral; e) Setífero 10., torácico; f) Seta torácica del setífero 10. Figs. a-d: tomadas de Fauvel 1927 y Hartman 1961.




Figura 39.7. *Streblosoma longifilis*: a) Región anterior, vista lateral; b, c) Cerdas notopodiales; Setígero 8; e) Uncinos, vista lateral; f) Uncinos, vista frontal; g) ganchos de setígero abdominal. Figs. a-(. e, f: tomadas de Rioja 1962.




Figura 39.8. *Thelepus setosus*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Región anterior, vista lateral; c) Uncino abdominal; d) Seta limbada torácica corta; e) Uncino torácico, vista lateral; f) Uncino torácico, vista frontal. Figs. Tomadas de Fauvel 1927 y Berkeley y Berkeley 1952.




Figura 40.1. *Euchone arenae*: a) Región terminal ventral, de la corona radiolar; b) Región terminal, vista ventra; c) Uncino abdominal; d) Seta superior torácica; e) Seta inferior torácica; f) Uncino acicular torácico. Figs. Tomadas de Hartman 1966a.




Figura 40.2. *Euchone incolor*. a) Cuerpo torácico con corona, vista lateral; b) Región anterior, vista ventral; c) Uncino abdominal acicular; d) Seta superior del notopodio torácico; e) Seta media del mismo; f) Seta inferior; g) Gancho torácico; h) Uncino del segmento anterior abdominal. Figs. a, c: tomadas de Hartman 1965a; Figs. b, d-h: tomadas de Banse 1970.




Figura 40.3. *Megalomma circumspectum*: a) Región anterior con base tentacular y collar de membrana; b) Collar membranoso y cojinetes anteriores; c) Ojos compuestos; d) Los mismos ojos vistos por otro lado; e) Seta espatulosa torácica; f) Cresta de uncino torácico. Figs. a-d: tomadas e Harman 1969; Figs. e, f: tomadas de Moore 1923.




Figura 40.4. *Megalomma pigmentum*: a) Región anterior y parte de la corona branquial, vista ventral; b) Región anterior, otro organismo; c, d) Setas superiores; e) Seta inferior; f-h) Ganchos torácicos aviculares. Figs. Tomadas de Perkins 1984.




Figura 40.5. *Myxicola infundibulum*: a) Organismo completo, vista ventral; b) Región anterior con radiolos cortados, vista ventral; c) Región distal de los radiolos con pínulas; d) Seta capilar; Uncino torácico; f) Uncino torácico con punta bífida; g) Uncino torácico, vista frontal; Uncino abdominal, vista lateral. Figs. a-c, e, f, h: tomadas de Fauvel 1927; Figs. d, g: tomadas de Day 1967.






Figura 40.6. *Potamilla reniformis*: a) Región anterior, vista dorsal; b) Collar, vista ventro lateral; c) Seta limbada; d) Notoseta torácica; e) Seta subespatulada; f) Palea notopodial torácica; g) Uncino torácico; h) Neuroseta torácica; i) Uncino abdominal. Figs. Tomadas de Uebelacker 1984.




Figura 41.1. *Pseudovermilia conchata*: a) Organismo completo, vista lateral; b, c) Uncinos torácicos; d) Uncino abdominal; e) Seta notopodial torácica; f) Parapodio torácico.