

¿SABÍAS QUÉ?

**EVITA
¡COMPRARLAS!
¡LIBERARLAS!
¡ALIMENTARLAS!**
en estado silvestre

En México viven

ESPECIES INVASORAS

ESTORNINO PINTO
Sturnus vulgaris

PALOMA DE COLLAR
Streptopelia decaocto

PERICO MONJE
Myiopsitta monachus

PALOMA DOMÉSTICA
Columba livia

ZANATE MAYOR
Quiscalus mexicanus

GORRIÓN CASERO
Passer domesticus

Más información en:
www.biodiversidad.gob.mx/invasoras



CONABIO
COMISIÓN NACIONAL PARA EL
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD



¿SABÍAS QUÉ?







**Especie
invasora**

LA COTORRA ARGENTINA...

Myiopsitta monachus

Origen:
Sudamérica

Otros nombres:
Perico monje
Cotorra uruguayaya

-  Puede construir nidos en árboles, palmeras y otros sitios.
-  Pone de 1 a 11 huevos hasta tres veces al año.
-  Es una especie altamente comercializada.
-  Cuando se escapa, forma grandes colonias descontroladas.

Considerada como plaga en cultivos, compite con otras especies de aves por el alimento o nidos y ocasiona diversos daños a edificios y vegetación.

**EVITA
¡COMPRARLA!
¡LIBERARLA!
¡ALIMENTARLA!
en estado silvestre**



Más información en:
www.biodiversidad.gob.mx/invasoras



CONABIO
COMISIÓN NACIONAL PARA EL
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD



IZTACALA



¿SABÍAS QUÉ...?

El perico monje

Myiopsitta monachus

➤ Es originario de Sudamérica.



Otros nombres:

- cotorra uruguaya
- cotorra monje
- cotorra argentina
- perico quaker

➤ Es uno de los pocos en su grupo que construyen nidos.




Anidan en huecos o paredes.




Nido construido por perico.

➤ Pone de 1 a 11 huevos, hasta tres veces al año.




➤ Su alimentación es muy variada



➤ Fue muy comerciado como mascota.

➤ Después de escaparse, han formado colonias reproductivas numerosas.



➤ Se beneficia del alimento proporcionado por las personas, lo cual les permite reproducción continua y pone en desventaja a muchas otras aves.

➤ Puede ser plaga de cultivos, competir con otras aves por alimento o sitios para anidar; ocasiona daños a vegetación, cultivos e infraestructuras.



Por su bien y el de otras aves...

EVITA
¡COMPRARLOS!
¡LIBERARLOS!
¡ALIMENTARLOS!
en estado silvestre

¿Sabes cuánto tiempo viven?



Guacamayas **50-100 años**



Loros **50-70 años**



Cacatúas **40-80 años**



Perico monje o
cotorra argentina
25-30 años



Pericos **15-35 años**



Periquitos del amor **15-20 años**



Lorikeet **15-20 años**

Periquitos **15-18 años**

Los loros, pericos, guacamayas y cacatúas
viven mucho más que otros animales.

Si no se cuenta con el tiempo, recursos y sitio
seguro para mantenerlos por muchos años,
lo mejor es no adquirirlos.



Periquito australiano **5-15 años**



CONABIO
COMISIÓN NACIONAL PARA EL
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

Las aves son parte de la fauna que podemos reconocer, algunas pueden ser perjudiciales. Conoce cuáles son y el daño que pueden causar.

En México hay entre 1,123 y 1,150 especies de aves. La mayoría de ellas tienen miles de años en el país. A estas especies las llamamos nativas.

Otras llegaron hace menos de 500 años, traídas por el hombre de sitios lejanos, a esas les llamamos exóticas. Algunas escaparon y han sobrevivido en libertad, en casos extremos proliferan más que las nativas, convirtiéndose en invasoras.

Las aves nativas tienen una historia evolutiva en los sitios donde habitan, están en equilibrio con el ambiente, con lo que consumen, tienen depredadores y competidores.

Un ave exótica puede causar grandes desequilibrios, al punto de afectar a otra fauna, o dañar recursos que el hombre aprovecha, como cultivos, construcciones; también puede ser portador de enfermedades para otras aves y el hombre.





Palomas domésticas y pericos monje alimentados por el humano, algunas tortolitas entre ellas.


Lo mejor que la gente puede hacer en las ciudades es no alimentarlas. Los jóvenes de estas aves se van a zonas rurales donde causan daños en cultivos. Ahí muchas veces es necesario su control.




Perico monje, especie invasora en México.

 lasavesysurelacionconelhombre.com.mx

 Las aves y su relación con el hombre

 @Lasavesysurelacionconelhombre

 /Lasavesysurelacionconelhombre

Para más información sobre especies invasoras:

Subcoordinación de
Especies Invasoras de la Conabio

www.biodiversidad.gob.mx/invasoras

www.gob.mx/conabio

www.encyclovida.mx

especiesinvasoras@conabio.gob.mx

Tel. +52 (55) 5004 3183



CONABIO

COMISIÓN NACIONAL PARA EL
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

Aves exóticas e invasoras más frecuentes en México



Paloma doméstica

Columba livia

Fue introducida por los españoles. Es la paloma que vemos en los parques e iglesias. Anida en las construcciones. Sus excretas dañan edificios y esculturas. Se han requerido redes y otros dispositivos para evitar su presencia y anidación, pero todo ello sin mucho éxito.



Palomas y pericos monje

Paloma turca de collar

Streptopelia decaocto

De origen eurasiático. Su introducción es reciente, pero se ha logrado adaptar y extender por áreas urbanas y rurales. Esta y otras especies similares pueden desplazar a las palomas nativas. Fue introducida por los españoles.




Grupo de palomas turcas de collar

Gorrión Doméstico

Passer domesticus

Fue introducido por los españoles; también llamado chillón. Solo vive cerca del humano. En algunas ciudades y poblados es el gorrión más común, en otras está siendo desplazado por aves nativas adaptadas a la cercanía del hombre.



Hembras y machos de gorriones

Perico monje

Myiopsitta monachus

De origen Sudamericano. Llegó por el comercio de mascotas y posterior escape o liberación. Su capacidad de fabricar nidos ocasiona daños a los árboles de los que obtienen las ramas, desplaza a otras aves. En sus nidos abandonados anidan otras aves exóticas.




Pericos monje en su nido

Estornino pinto

Sturnus vulgaris

Llegó de Europa. Su incremento inició en el siglo XX. Aunque es un ave insectívora se ha convertido en plaga de cultivos por su capacidad de formar parvadas de miles y poder atacar brotes.



Estorninos en zona rural

Zanate mayor

Quiscalus mexicanus

Ave mexicana, pero solo habitaba cerca del Golfo de México. Llegó al centro de México por órdenes de un emperador azteca y desde entonces se ha extendido a todo el país. Es generalista en su alimentación y ataca tanto a cultivos como a otras aves. Forma grandes grupos que duermen y anidan en parques y plazas.



Zanate macho, la hembra es café y más pequeña